



Vaccination COVID et COVID déclaré

30/07/2021

Un patient est infecté par la COVID-19 alors qu'il est en cours de vaccination (hors Janssen).

Deux possibilités :

Infection par le COVID-19 survenant moins de 15 jours après la première dose de vaccin

La simulation vaccinale et l'exposition au virus est trop proche pour être considérée comme suffisante

Une **seconde dose de vaccin** sera nécessaire entre **deux et six mois après l'infection**.

Infection par le COVID-19 survenant plus de 15 jours après la première dose de vaccin

Le COSV (Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale) considère que le délai entre la vaccination et l'infection est suffisant pour induire une simulation vaccinale efficace.

Une seconde dose de vaccin ne sera pas nécessaire

Pour pouvoir valider le **schéma vaccinal en une seule dose**, la preuve de la contamination doit être fournie au professionnel de santé qui le clôturera le cycle dans Vaccin Covid.

Le patient doit fournir :

- Un test RT-PCR positif de plus de 15 jours après la première injection
- Un test sérologique anti-N positif de plus de 15 jours après la première injection



Exclusion : les **personnes immunodéprimées** ou **très fragiles** ne pourront pas bénéficier de la vaccination en une seule dose (pour les vaccins à deux doses). Ces personnes, à risque de formes graves de la COVID-19 devront recevoir au moins deux doses