



	Comirnaty pédiatrique (Pfizer)	Comirnaty adulte à reconstituer (Pfizer)	Comirnaty adulte prêt à l'emploi (Pfizer)	Spikevax (Moderna)	Nuvaxovid (Novavax)
Antigène	ARN messenger (protéine Spyke S)				Protéine recombinante Spyke S
Couleur du bouchon	Bouchon orange	Bouchon violet	Bouchon gris	Bouchon rouge	Bouchon bleu
Age vaccination	5-11 ans	12 ans et +	12 ans et +	30 ans et +	18 ans et +
Conservation 2 à 8°C flacon non percuté	10 semaines abri lumière	4 semaines abri lumière	10 semaines abri lumière	30 jours abri lumière	9 mois abri lumière
Conservation flacon percuté	12 heures (2-30°C)	6 heures (2-30°C)	12 heures (2-30°C) idéal 2-8°C	19 heures (2-25°C) idéal 2-8°C	6 heures (2-25°C)
Préparation des doses à l'avance	Possible (conservation 2-30°C) idéal 2-8°C			Possible (conservation 2-8°C)	Possible (conservation 2-8°)
Nb de doses/flacon	10 doses (12 avec seringues faible volume mort)	6 doses (7max)	6 doses	Primo 10 doses (12 max) Rappel 20 doses (24 max)	10 doses
Quantité diluant à ajouter	1,30 ml sol. injectable NaCl 0,9%	1,80 ml sol. injectable Na Cl 0,9%	Non concerné	Non concerné	Non concerné
Une dose	0,20 ml (10 µg ARNm)	0,30 ml (30 µg ARNm)		Primo 0,50 ml (100 µg ARNm) Rappel 0,25 ml (50 µg ARNm)	0,50 ml (5µg protéine Spyke) + matrice-M
Taille aiguille injection	16 mm (25G)	(23-25 G longueur adaptée)		(23-25 G longueur adaptée)	(23-25G longueur adaptée)
Avant extraction	Retourner 10 fois délicatement	Retourner 10 fois délicatement		Retourner délicatement	Retourner délicatement
Aspect de la solution	Dispersion couleur blanche à blanc laiteux exempte de particules solides	Dispersion blanc cassé exempte de particules solides	Dispersion blanc à blanc cassé. Particules blanches ou translucides possible	Dispersion blanc à blanc cassé. Particules blanches ou translucides possible	Dispersion incolore à légèrement jaune limpide à légèrement opalescente sans particules solides
Volume total	2,6 ml	2,25 ml	2,25 ml	5 ml	5 ml
Primo vaccination Nombre de doses Ecart entre 2 doses	2 injections 18 à 24 jours	2 injections 21 à 49 jours		2 injections 28 à 49 jours	2 injections 18 à 28 jours
Utilisation	Primovaccination Rappel				Primo vaccination Pas de rappel
Lieu de l'injection	Intramusculaire dans le deltoïde				